Oざいふりぼくノ花ノ枝

ざいふりぼくノ花ヲ含ンデヰル芽ガ萠エルト中カラ花序ヲ戴イテヰル新シイ枝ガ伸出ス。 ソノ枝ノ上ニハ三四枚ノ葉ガ附イテヰテ、ソノ一二ノ葉ノ腋カラ更ニ側枝ガ伸出シテヰル。 即チ 花芽ハ萠エナガラソノ 新シイ主枝ノ上ニ側枝ヲ分ツテキルノデアル。側枝ノ上ニハ秋 ニナレバソノ枝ノ 先ヤ葉ノ腋ニ鱗芽が出ル。コノ 芽ガ冬ヲ越シテアクル年ノ春萠出テ來年 ノ枝ニナル。側枝ハソノ 主枝ヨリモハルカニ 長ク伸ビルコトガアルカラ花序ヲ戴イテヰル 主枝ガソノ側枝ニ對シテ 却ツテ傍枝ノ如ク 見エルヤウニナルコトガアル。我國ノざいふり ぼくノ花ノ枝ハ大方コノ様ナ枝ニナルノデアルガ、コレニ類スルモノハ梨ヤ林檎ノ花ノ枝デ アル。あづきなしナドニアツテハ花芽ガ 萠エテモスグニソノ新シイ 花ノ枝ノ上ニ側枝ガ伸 ビ出スコトハナイ。花ノ枝ノ葉腋ニアル芽ハ 芽鱗ニ包マレテ鱗芽ニナリ冬ヲ 越シテ翌年ノ 春ニナツテ萠出テハジメテ枝ニナル。コノ枝ハソノ 母枝ニ對シテハ同年ノ 枝デハナクテ次 年ノ枝デアル。花ノ枝ハ春萠出テカラ 翌年ノ春次ノ年ノ 枝ガソノ上ニ萠出ルマデ一年ノ間 單一デ枝ヲ分ツコトガナイ。然ルニ コノざいふりぼくノ 花芽ガ萠エルトスグニソノ新シイ 主枝ノ上=側枝ヲ分ツ。薬腋ノ 芽ガ鱗芽ニナルノヲ待タナイノデスグニ伸出シテコノ 側枝 ニナルノデアツテ 主枝トソノ側枝トハ 同年ノ枝ニ屬シテキル。ソッテ來年ノ枝ニナルベキ 鱗芽ハ主枝ノ上ニナクテ側枝ノ上ニ出ルノデアル。Siebold ノ Flora Japonica ノざいふ りぼくノ記載ノ中ニコノ枝ブリノコトガ次ノヤウニ書イテアル。 (籾山泰一)

"Florum racemi coëtanei, in ramulis hornis lateralibus abbreviatis et foliis 3-4 approximatis obsitis terminales, sed ob gemmam, quæ ex unius foliorum inferiorum axilla in rami incrementum simul provenit, tandem laterales,....."

Oせんぶりノ白花品

上總國山武郡源村ノ山地デ若名東一氏ガせんぶリノ純白花ヲ開クモノヲ見出サレタノデ しろばなせんぶリト新稱スル。 (前川文夫)

Swertia japonica Makino forma chionantha F. Maekawa form. nov. Flores albi.

Hab. Japonia, Hondo, prov. Kadzusa, oppido Minamoto (T. WAKANA, Oct. 29, 1935)

(F. MAEKAWA).

〇たねがしまむえふらんノ北限

本種 (Aphyllorchis tanegashimensis HAYATA) ハ該屬ノ本邦唯一ノ代表者デアルが種子島、屋久島、及ビ沖繩本島 (?) ニ産シ臺灣ニハマダ知ラレテ居ラヌ無葉蘭デアル。先日土井美夫氏送品中ニコレガアツタガ 産地ハ大隅國高隈山デ 堀金義氏ノ採集デアル。コレデ本種ハ九州本土=知レタワケデアルガ分布上興味ガアル。

Oよこぐらのきノ産地